



**Tabelle riassuntive  
Sintesi dei risultati della sorveglianza  
PASSI 2018 – 2021  
Uls 2 Marca trevigiana**

## Descrizione del campione

Uiss 2	
<b>Numerosità</b>	1337
	%
Uomini	50.31
Donne	49.69
<b>Classi di età</b>	
18-34	25.88
35-49	31.98
50-69	42.14
<b>Titolo di studio</b>	
Nessuno/elementare	3.3
Media Inferiore	28.86
Media superiore	50.47
Laurea	17.36
<b>Livello di istruzione</b>	
Basso**	32.16
Alto*	67.84
<b>Stato civile</b>	
Coniugati	53.83
Celibi/nubili	36.98
Vedovi/e	2.57
Separati/divorziati	6.62
<b>Cittadinanza</b>	
Italiana	90.18
Straniera	9.82
<b>Situazione lavorativa***</b>	
Occupato	67.49
Non Occupato	32.51
<b>Difficoltà economiche</b>	
Molte	4.83
Qualche	27.21
Nessuna	67.96

\*licenza media superiore o laurea

\*\*licenza media inferiore o licenza elementare o nessun titolo

\*\*\*campione compreso tra 18 e 65 anni

	Uiss 2		
	%	IC 95%	
<b>Salute percepita</b>			
Molto bene/bene	77.82	75.38	80.08
discretamente	20.59	18.44	22.93
Male / molto male	1.59	1	2.51
<b>Persone con una percezione della salute positiva (bene / molto bene)</b>			
<b>• genere</b>			
Uomini	82.14	78.57	85.22
Donne	73.44	70.02	76.6
<b>• classi di età</b>			
18-34	91.74	88.19	94.3
35-49	81.36	77.21	84.91
50-69	66.57	62.31	70.58
<b>• titolo di studio</b>			
Nessuno/ elementare	57.92	43.31	71.26
Media Inferiore	70.05	64.92	74.73
Media superiore	80.26	76.77	83.33
Laurea	87.35	81.99	91.28
<b>• difficoltà economiche</b>			
Molte	58.26	44.13	71.14
Qualche	71.79	66.64	76.42
Nessuna	81.54	78.74	84.04
<b>• cittadinanza</b>			
Italiana	76.3	73.7	78.73
Straniera	87.91	80.98	92.55
<b>• presenza di patologie</b>			
Almeno una patologia cronica	54.81	48.26	61.18
<b>Numero di giorni riferiti con limitazione di attività per motivi fisici e psicologici</b>			
0 giorni	82.16	79.82	84.28
1-13 giorni	15.19	13.2	17.43
14+ giorni	2.65	1.86	3.77
<b>Sintomi di depressione (%-IC 95%)</b>			
Nelle ultime due settimane	6.27	4.96	7.9
Ha cercato aiuto da qualcuno	33.63	23.44	45.61
<b>La richiesta di aiuto per sintomi di depressione</b>			
Medico/operatore sanitario	19.84	11.95	31.08
Famiglia/amici	9.82	3.62	23.96
Entrambi	8.99	3.76	19.98
Nessuno	61.36	48.56	72.76

## Attività fisica

Ulss 2			
	%	IC 95%	
<b>Livello di attività fisica</b>			
Attivo*	53.23	50.39	56.06
Parzialmente attivo**	31.94	29.22	34.79
Sedentario***	14.82	12.95	16.92
<b>Sedentari per:</b>			
<b>• genere</b>			
Uomini	12.65	10.11	15.71
Donne	17.03	14.4	20.04
<b>• classi di età</b>			
18-34	13.94	10.12	18.89
35-49	10.87	8.16	14.32
50-69	18.38	15.53	21.63
<b>• titolo di studio</b>			
Nessuno/elementare	36.97	24.1	52
Media Inferiore	13.87	10.8	17.63
Media superiore	13.77	11.21	16.82
Laurea	15.37	10.93	21.19
<b>• difficoltà economiche</b>			
Molte	25.28	16.16	37.26
Qualche	19.1	15.19	23.75
Nessuna	12.01	9.96	14.42
<b>• cittadinanza</b>			
Italiana	14.5	12.49	16.78
Straniera	19.6	13.34	27.86
<b>• patologie</b>			
Sintomi di depressione	23.73	15.11	35.23
Fumatore	10.51	7.56	14.43
Ipertensione	22.46	17.56	28.26
Sovrappeso	16.17	13.28	19.55
<b>Comportamento del medico o dell'operatore sanitario****</b>			
Ha consigliato di fare dell'attività fisica	35.14	32.24	38.15
<b>Percezione del livello di attività fisica</b>			
Sedentari che percepiscono sufficiente il proprio livello di attività fisica	12.65	8.42	18.56

\*lavoro pesante oppure adesione alle linee guida (30 minuti di attività moderata per almeno 5 giorni alla settimana oppure attività intensa per più di 20 min per almeno 3 giorni)

\*\*non fa lavoro pesante, ma fa qualche attività fisica nel tempo libero, senza raggiungere i livelli raccomandati

\*\*\*non fa un lavoro pesante e non fa nessuna attività fisica nel tempo libero

\*\*\*\*vengono escluse le persone che non sono state dal medico negli ultimi 12 mesi

## Situazione nutrizionale e abitudini alimentari

Ulss 2			
	%	IC 95%	
<b>Situazione ponderale</b>			
Sottopeso/normopeso	59.09	56.28	61.84
Sovrappeso	30.84	28.26	33.54
Obeso	10.07	8.48	11.92
Eccesso ponderale (sovrappeso /obeso)	40.91	38.16	43.72
Almeno 5 porzioni di frutta e verdura al giorno	12.32	10.6	14.27

Persone in <u>eccesso ponderale:</u>	Sovrappeso			Obesi		
	%	IC 95%		%	IC 95%	
<b>• genere</b>						
Uomini	39.91	35.9	44.06	10.15	8	12.81
Donne	21.61	18.64	24.92	9.98	7.78	12.72
<b>• classi di età</b>						
18-34	18.74	14.45	23.95	2.7	1.39	5.16
35-49	26.86	22.39	31.86	13.12	9.98	17.05
50-69	41.23	37.18	45.4	12.27	9.75	15.33
<b>• titolo di studio</b>						
Nessuno/elementare	37.16	24.27	52.18	24.58	14.29	38.91
Media Inferiore	36.5	31.33	42	13.75	10.51	17.78
Media superiore	28.43	24.79	32.37	9.58	7.39	12.32
Laurea	27.34	21.49	34.09	2.72	1.19	6.12
<b>• difficoltà economiche</b>						
Molte	38.67	25.82	53.32	17.7	10.47	28.34
Qualche	29.48	24.63	34.85	14.06	10.7	18.25
Nessuna	31.06	27.86	34.46	7.91	6.17	10.09
<b>• cittadinanza</b>						
Italiana	30.2	27.52	33.02	9.44	7.84	11.33
Straniera	34.57	26.33	43.84	16.42	10.82	24.15
Consiglio perdita/controllo del peso	43.09	37.6	48.76	76.59	67.56	83.72

\*vengono escluse le persone che non sono state dal medico negli ultimi 12 mesi

## Consumo di alcol

Ulss 2			
	%	IC 95%	
<b>Consumo di alcol</b>			
Consumo di alcol almeno una unità di bevanda alcolica negli ultimi 30 giorni*	69.69	66.93	72.32
Fuori pasto (esclusivamente o prevalentemente)	18.65	16.37	21.15
Consumo binge **	15.15	13.2	17.34
Consumo abituale elevato***	4.5	3.46	5.82
Consumo a maggior rischio ****	29.94	27.34	32.68
<b>Consumatori a maggior rischio per:</b>			
<b>• genere</b>			
Uomini	37.84	33.9	41.96
Donne	21.93	18.72	25.52
<b>• classi di età</b>			
18-24	59.62	50.13	68.43
24-34	45.09	37.06	53.37
35-49	26.53	22.02	31.59
50-69	19.09	16	22.61
<b>• titolo di studio</b>			
Nessuno/elementare	12.93	6.46	24.21
Media Inferiore	27.15	22.62	32.21
Media superiore	31.55	27.78	35.58
Laurea	33.31	27.03	40.24
<b>• difficoltà economiche</b>			
Molte	31.83	20.24	46.21
Qualche	24.22	20.07	28.91
Nessuna	32.05	28.78	35.51
<b>• cittadinanza</b>			
Italiana	31.46	28.76	34.29
Straniera	18.01	11.66	26.76
<b>Comportamento del medico o dell'operatore sanitario*****</b>			
Consigliato ai bevitori a maggior rischio di ridurre il consumo	4.39	2.71	7.05

\*una unità di bevanda alcolica (UA) equivale ad una lattina di birra o a un bicchiere di vino o ad un bicchiere di liquore

\*\*5 o più UA (per gli uomini) o 4 o più UA (per le donne) in una singola occasione, almeno una volta negli ultimi 30 giorni (definizione adottata dal 2010)

\*\*\*più di 2 UA medie giornaliere, ovvero più di 60 unità alcoliche negli ultimi 30 giorni, (per gli uomini); più di 1 UA media giornaliera, ovvero più di 30 unità alcoliche negli ultimi 30 giorni (per le donne)

\*\*\*\*consumo fuori pasto e/o consumo binge (secondo la definizione valida dal 2010) e/o consumo abituale elevato

\*\*\*\*\*vengono incluse solo le persone che riferiscono di essere state dal medico negli ultimi 12 mesi

## Abitudine al fumo

Ulss 2			
	%	IC 95%	
<b>Abitudine al fumo</b>			
Fumatori*	23.33	20.97	25.87
Ex-fumatori**	19.88	17.65	22.31
Non fumatori***	56.79	53.86	59.67
<b>Fumatori per:</b>			
• <b>genere</b>			
Uomini	28.04	24.41	31.97
Donne	18.57	15.73	21.79
• <b>classi di età</b>			
18-24	33.34	24.25	43.87
25-34	28.71	22.47	35.88
35-49	26.59	22.2	31.49
50-69	16.29	13.3	19.79
• <b>titolo di studio</b>			
Nessuno/elementare	12.87	6.05	25.3
Media Inferiore	28.12	23.44	33.33
Media superiore	21.73	18.52	25.31
Laurea	22.08	17.11	28.01
• <b>difficoltà economiche</b>			
Molte	41.91	29.76	55.13
Qualche	24.83	20.36	29.91
Nessuna	21.42	18.65	24.48
• <b>cittadinanza</b>			
Italiana	23.2	20.69	25.92
Straniera	22.73	15.86	31.46
<b>Comportamento del medico o dell'operatore sanitario****</b>			
Ha chiesto se fuma	47.52	44.4	50.67
Ha consigliato di smettere di fumare	48	41.22	54.85
<b>Smettere di fumare</b>			
Fumatori che hanno tentato di smettere nell'ultimo anno	46.88	41.05	52.79
Fumatori che hanno tentato di smettere senza ausilio	88.34	84.87	91.09
<b>Il rispetto del divieto di fumare</b>			
Nel luogo di lavoro (sempre/quasi sempre)	96.69	95.24	97.71
Nei luoghi pubblici (sempre/quasi sempre)	92.97	91.09	94.48
Nella propria abitazione (sempre)	92.74	91	94.16

\*più di 100 sigarette nella propria vita e attualmente fumano tutti i giorni o qualche giorno o hanno smesso da meno di sei mesi

\*\*più di 100 sigarette nella propria vita e attualmente non fumano da almeno 6 mesi

\*\*\*meno di 100 sigarette nella propria vita e attualmente non fumano o non hanno mai fumato

\*\*\*\*vengono escluse le persone che non sono state dal medico negli ultimi 12 mesi

## Ipertensione

	Ulss 2		
	%	IC 95%	
<b>Ipertensione arteriosa</b>			
Misurazione di P.A. negli ultimi 2 anni	94.6	92.74	96
Persone che riferiscono di essere ipertese**	20.19	17.78	22.84
<b>Trattamento dell'ipertensione</b>			
Trattamento farmacologico	68.49	62.34	74.05
Ridurre consumo di sale	74.43	68.14	79.85
Perdita/controllo del peso	76.26	70	81.55
Attività fisica regolare	82.91	77.26	87.39

## Ipercolesterolemia

	Ulss 2		
	%	IC 95%	
<b>Ipercolesterolemia</b>			
Misurazione del colesterolo almeno una volta negli ultimi 12 mesi	78.43	75.63	81
Persone che riferiscono di essere ipercolesterolemiche***	24.08	21.47	26.9
<b>Trattamento dell'ipercolesterolemia</b>			
Trattamento farmacologico	30.58	24.92	36.9
Più consumo di frutta/verdura	64.39	57.95	70.36
Meno consumo di carne/formaggi	80.49	74.91	85.08
Perdita/controllo del peso	69.46	63.21	75.07
Attività fisica regolare	81.39	75.72	85.98

\*su tutte le persone >34 anni, senza patologie cardiovascolari

\*\*Tra le persone a cui è stata misurata la pressione arteriosa

\*\*\*Tra le persone a cui è stata misurata la colesterolemia

## Diabete

	Ulss 2		
	%	IC 95%	
<b>Diabete</b>			
Prevalenza di diabetici	4.56	3.5	5.91

## Diagnosi precoce delle neoplasie

	Ulss 2		
	%	IC 95%	
<b>Collo dell'utero</b>			
Effettuato un pap test preventivo negli ultimi 3 anni	89.61	86.05	92.34
Donne che hanno aderito allo screening organizzato	75.5	71.36	79.21
Donne che hanno effettuato il test spontaneamente	14.03	11.21	17.43
<b>Mammella</b>			
Effettuato una mammografia negli ultimi 2 anni	75.85	70.79	80.27
Donne che hanno aderito allo screening organizzato	50.95	46.14	55.75
Donne che hanno effettuato il test spontaneamente	24.74	20.9	29.02
<b>Colon-retto</b>			
Eseguito un test per la ricerca del sangue occulto a scopo preventivo negli ultimi 2 anni	74.5	69.82	78.68
Eseguita una colonscopia/rettosigmoidoscopia a scopo preventivo negli ultimi 5 anni	16.05	12.99	19.67

## Vaccinazioni

	Ulss 2		
	%	IC 95% %	
<b>Antinfluenzale*</b>			
Vaccinati 18-64	7.16	5.49	9.3
Vaccinati 18-64 con almeno 2 patologie	18.55	6.72	41.85
<b>Antirosolia</b>			
Donne vaccinate 18-49 anni	68.27	62.07	73.89
Donne (18-49 anni) suscettibili**	24.05	19.09	29.82

\*campagna 2016-2017

\*\* non vaccinate e rubeotest negativo

## Sicurezza

	Ulss 2		
	%	IC 95% %	
<b>Sicurezza stradale</b>			
Cintura anteriore sempre	96.37	94.94	97.41
Cintura posteriore sempre	55.24	52.05	58.39
Casco sempre	98.7	96.57	99.51
Guida sotto l'effetto dell'alcol*	9.6	7.74	11.86
Trasportato da un conducente sotto l'effetto dell'alcol	7.81	6.24	9.73
<b>Sicurezza domestica</b>			
Consapevolezza del rischio di infortunio domestico**	7.45	6.02	9.19
Infortunio per il quale c'è stato ricorso al medico di famiglia, al pronto soccorso o all'ospedale***	3.9	2.85	5.32

\*percentuale di persone che dichiarano di aver guidato un'auto o una moto, negli ultimi 30 giorni, entro un'ora dall'aver bevuto 2 o più UA (su tutti quelli che, negli ultimi 30 giorni, hanno bevuto almeno un'unità alcolica e hanno guidato)

\*\*Persone che dichiarano *alto o molto alto il rischio* di infortunio in ambiente domestico, per sé o i propri familiari

\*\*\*Persone che dichiarano di aver avuto un infortunio domestico nei 12 mesi precedenti, per il quale è stato necessario il ricorso al medico di famiglia, al pronto soccorso o all'ospedale