

الحمل و التطعيم (Gravidanza e vaccinazioni)

معلومات عن بعض أمراض الحمل الخطيرة للغاية



يمكن أن تؤثر بعض الأمراض سلبيًا على الخصوبة أو تؤثر على نتائج الحمل.

جدري الماء

(Varicella VAR)

يمكن أن يمثل جدري الماء ، إذا تم التقاطه أثناء الحمل ، خاصة في فترة ما قبل الولادة مباشرة ، خطرًا على المرأة والطفل الذي لم يولد بعد. بعد التطعيم ، من الضروري الانتظار لمدة شهر على الأقل قبل الحمل. يتم التطعيم بجرعتين وهو مجاني.

فيروس الورم الحليمي البشري (HPV)

(Papilloma virus HPV)

يوصى بالتطعيم لجميع النساء لمنع الآفات السابقة للسرطان إذا كان سرطان عنق الرحم. التطعيم في منطقة فينيتو مجاني للنساء المولودات بعد عام 1996 حتى سن 26. تتضمن الدورة جرعتين أو ثلاث جرعات من اللقاح حسب العمر.

أثناء الحمل (Durante la gravidanza)

قم دائمًا بتطعيم نفسك ضد:

الزكام

(Influenza)

يمكن أن يتسبب الزكام الذي ينتقل أثناء الحمل في حدوث مشاكل صحية خطيرة للنساء المعرضات لخطر الإضرار بالمسار الطبيعي للحمل (الولادة المبكرة وانخفاض وزن الطفل عند الولادة) خلال موسم الزكام ، يوصى بالتطعيم مجانًا لجميع النساء الحوامل.

السعال الديكي

(Pertosse)

يعتبر السعال الديكي مرضًا معديًا خطيرًا بشكل خاص إذا تم التعرض عليه في السنة الأولى من العمر لأنه يمكن أن يسبب أيضًا تلفًا عصبيًا أو الوفاة. في الأشهر الأولى من الحياة قبل البدء في دورة التطعيم لا يمكن حماية الطفل إلا من خلال الأجسام المضادة التي يتم تلقيها من الأم. لذلك ، يوصى بجرعة معززة لكل حمل حتى لو كانت المرأة قد تم تطعيمها بالفعل أو كانت مصابة بالسعال الديكي. أفضل فترة للتلقيح هي ما بين الأسبوع السابع والعشرين والسادس والثلاثين من الحمل. لا يوجد لقاح واحد ضد السعال واللقاح الوحيد المتاح هو الخناق والكزاز والسعال الديكي. (DPT) التطعيم مجاني للجميع.

التطعيمات الموصى بها آمنة حتى لو كانت المرأة ترض.

الوقاية من خلال التطعيم هي واحدة من أكثر وسائل فعالية الصحة العامة لأنها قادرة بشكل فعال وآمن على منع تطور بعض الأمراض المعدية ومضاعفاتها وانتشارها.



قبل الحمل

(Prima di una gravidanza)

تحقق مما إذا كنت محميًا باللقاحات ضد:

دفتيريا، سعال، ديكى كزاز (DPT)

(Difterite, tetano e pertosse DTP)

يوصى بجرعة معززة للقاح ثلاثي التكافؤ كل 10 سنوات ضد الخناق و الشاهوق و الكزاز لجميع البالغين لأن الأمراض الثلاثة واللقاحات الخاصة بهم لا توفر حماية دائمة.

يسمح لقاح السعال الديكي المعزز بالحفاظ على مناعة البكتيريا ويحمي الأطفال على وجه الخصوص في الأشهر الأولى من الحياة. التطعيم مجاني للجميع.

الحصبة، النكاف، الحصبة الألمانية (MPR)

(Morbillo, parotite e rosolia MPR)

الحصبة مرض شديد العدوى يمكن أن يكون له مضاعفات خطيرة ؛ يمكن أن يزيد النكاف من خطر الإجهاض ؛ يمكن أن تسبب الإصابة بالحصبة الألمانية أثناء الحمل إجهادًا أو ضررًا خطيرًا للطفل الذي لم يولد بعد (الحصبة الألمانية خلقي)

التطعيم هو الإجراء الوقائي الوحيد. يوصى بجرعتين من

لقاح الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية (MPR) لجميع

النساء غير المحميات. بعد التطعيم ، من الضروري

الانتظار لمدة شهر على الأقل قبل الحمل.

اللقاح الثلاثي التكافؤ ضد الحصبة والنكاف والحصبة

الألمانية مجاني للجميع.

يمكن القيام بالمزيد من أجل الشاهوق

(Per la pertosse si può fare di più)

كيف يتم التطعيم؟

(Come vaccinarsi)

حدد موعدًا مع خدمات التطعيم لجدولة جميع التطعيمات مسبقًا. لست بحاجة إلى إحالة من الطبيب.

ما يجب إحضاره في يوم الموعد:

- السجلات الصحية الشخصية
- أي اختبارات للحصبة وجذري الماء والحصبة الألمانية
- بطاقة تأمين صحي.

قم بزيارة الموقع

Aulss2.veneto.it/vaccini

او امسح رمز الاستجابة السريعة الموجود بجانب كاميرا هاتفك المحمول

لمزيد من المعلومات ، يمكنك الاتصال بطبيبك أو طبيب أمراض النساء أو خدمة التطعيم في منطقتك.

غالبًا ما ينقل البالغون (الآباء أو الأعمام أو الأجداد) العدوى إلى الطفل الذي لم يولد بعد. يمكن أيضًا للآباء والأجداد ، بالإضافة إلى الأشخاص الآخرين الذين سيهتمون بالطفل ، تلقيح ضد السعال الديكي لإنشاء حاجز وقائي حول الطفل. في هذه الحالة ، يوصى بالتطعيم إذا مر أكثر من 10 سنوات على آخر جرعة معززة.

الدفتيريا

(Difterite)

الدفتيريا مرض معد ينتقل عن طريق الاتصال المباشر بقطرات لعاب شخص مصاب أو ، في حالات نادرة ، عن طريق أشياء ملوثة بإفرازات شخص مريض (حتى بدون أعراض). يمكن أن يسبب مضاعفات خطيرة متعددة الأعضاء خاصة عند الأطفال دون سن 5 سنوات. في الأشهر الأولى من العمر ، قبل بدء دورة التطعيم لا يمكن حماية الطفل إلا من خلال الأجسام المضادة التي يتم تلقيها من الأم.

كوفيد-19

(Covid-19)

يزيد فيروس SARS-CoV-2 ، المسؤول عن مرض COVID-19 ، من خطر حدوث مضاعفات خطيرة والولادة المبكرة عند النساء الحوامل. التطعيم الأولي ضد COVID-19 والجرعات المنشطة بلقاح mRNA آمن ويوصى به لجميع النساء الحوامل.

بعد الحمل

(Dopo una gravidanza)

إذا لم تكن محميًا من:

الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية وجذري الماء

(Morbillo, parotite, rosolia e varicella)

إذا كنت غير محمية من الحصبة أو النكاف أو جذري الماء أثناء الحمل ، فهو كذلك

يتلقى الكثير منهم التطعيم (ثلاثي التكافؤ من الحصبة، النكاف، الحصبة الألمانية و / أو جذري الماء) لحماية نفسك وكذلك الطفل الذي لم يولد بعد تحسباً للحمل الوشيك.

التطعيمات المشار إليها مجانية ويتم إعطاؤها على جرعتين متباعدتين كل شهر. تذكر أنه بعد التطعيم بلقاح ثلاثي التكافؤ من الحصبة، النكاف و الحصبة الألمانية (MPR) و جذري الماء ، يُنصح بالانتظار لمدة شهر على الأقل قبل محاولة الحمل مرة أخرى.

تمت صياغة الوثيقة من قبل فريق متعدد التخصصات من وحدة الأعمال ومكتب العلاقات العامة.

آخر تحديث ابريل 2023