

Gjinekologji (Ginecologia)

Papillomavirusi (Papillomavirus)

Cfarë është dhe si parandalohet (Cos'è e come si previene)

ULSS 2 | Papillomavirusi

Infeksioni i papillomavirusit është infeksioni më i shpeshtë seksualisht i transmetueshëm. Është më i përhapur në popullatë femërore dhe mund të shkaktojë kancerin i qafës së mitrës.

Atuti për betejën kundër infeksionit nga papillomavirusi është parandalimi: Rajoni Veneto promovon programin e shqyrtimit i cili përfshin testime të rregullta dhe falas.

PAPILLOMAVIRUSI (Il papillomavirus)

Cfarë është (Cos'è)

Është një virus i të cilit ka mbi 100 lloje: disa janë përgjegjës për lëndimet beninje, të tjerët janë në gjendje të prodhojnë leziona parainvazive (displazi) dhe invazive. Nder keto, kryesori për nga frekuenca dhe ndikimi në shëndet është kanceri i qafës së mitrës, i cili shkaktohet pothuajse në të gjitha rastet nga infeksioni HPV (*Human Papilloma Virus*).

SI TRANSMETOHET (Come si trasmette)

Infeksioni HPV është deri tani infeksioni më i shpeshtë seksualisht i transmetueshëm: mungesa e simptomave favorizon përhapjen nga që shumica e individëve të prekur nuk është në dijeni të procesit infektiv në vazhdim. Infeksioni me HPV është më i shpeshtë tek femrat.

SI DIAGNOSTIKOHET (Come si diagnostica)

Është e mundur të identifikohet herët një lezion gjenital "i rrezikshëm" duke iu nënshtruar rrevullisht një Pap-testi ose ekzaminimit citologjik cervikal-vaginal, një grumbullimi i qelizave nga sipërfaqja e qafës dhe kanali cervikal i mitrës, ose një test HPV, i cili parashikon një tërheqje të ngjashme me atë të Pap-testit.

Pap testi dhe HPV testi janë teste të thjeshta, të shpejta dhe pa dhimbje. Të kryera rregullisht, sipas orareve të parashikuara në programet e depistimit, mundësojnë identifikimin e displazive, heqjen e tyre dhe parandalimin e zhvillimit të tumorit.

SI TA PARANDALONI (Come si previene)

Atuti për betejën kundër infeksionit papillomavirus dhe sëmundjeve që lidhen me të, kryesisht kanceri i qafës së mitrës, është parandalimi.

Sot ne kemi në dispozicion vaksina që janë të sigurta, të toleruara mirë dhe efektive në parandalimin e shfaqjes së infeksionit të vazhdueshëm nga shtamet e virusit HPV përgjegjës për shumicën e rasteve të kancerit të qafës së mitrës.

Megjithatë, duhet theksuar se përdorimi i vaksinës mbështet, por nuk e zëvendëson, depistimin me Pap testin dhe testin HPV.

Në fakt, duke qenë se vaksina nuk ofron mbrojtje kundër të gjitha llojeve të HPV-së dhe se, në çdo rast, asnjë vaksinë nuk mund të garantojë mbrojtje 100%, këshillohet që të gjitha gratë t'i përmbahen ekzaminimeve, edhe pas vaksinimit.

SCREENING I QAFËS SË MITRËS NË VENETO (Lo screening della cervice uterina in Veneto)

Cfarë është (Cos'è)

Është një program parandalimi që synon të reduktojë vdekshmërinë nga kanceri i qafës së mitrës, duke lejuar diagnostikimin dhe identifikimin e hershëm të lezioneve të veçanta që kanë një probabilitet të lartë për t'u evoluar në kancer (lezionet parakanceroze).

PER KE ESHTË (A chi si rivolge)

Ai u drejtohet të gjitha grave që kanë vendbanim në Veneto duke filluar nga moshë 25 ose 30 vjeç, në varësi të statusit të vaksinimit për vaksinimin kundër papillomavirusit (HPV) dhe deri në 64 vjeç.

Gratë e vaksinuara kundër HPV deri në moshën 15 vjeçare kanë një rrezik shumë i vogël për të zhvilluar kancer ose leziona pretumorale, kështu që ata fillojnë ekzaminimin në të 30-at e tyre. Gratë që nuk janë vaksinuar kundër HPV deri në moshën 15 vjeç, nga ana tjetër, fillojnë depisimin në moshën 25 vjeçare.

ÇFARË PARASHIKON (Cosa prevede)

Programi i skriningut të qafës së mitrës propozon, me anë të një letre ftese:

- Pap testi çdo tre vjet për gratë e moshës 25 deri në 29 vjeç që nuk janë vaksinuar kundër HPV
- Testi HPV çdo 5 vjet për të gjitha gratë e moshës 30 deri në 64 vjeç.

Testi më i përshtatshëm i depistimit ofrohet për çdo grupmoshë, në bazë të karakteristikat e testit dhe në rrezikun e gruas për të zhvilluar kancer ose leziona pretumorale.

DALLIMET MIDIS TESTIT HPV DHE PAP TESTIT (Differenze tra test HPV e PAP test)

Testi HPV është një test i prezantuar së fundmi që kërkon infeksionin nga HPV, ndërsa Pap testi kërkon lezionet e shkaktuara nga vetë infeksioni.

Testi HPV është më i ndjeshëm se Pap testi dhe, për këtë arsye, mund të kryhet çdo 5 vjet në vend të 3. Megjithatë, duke qenë se infeksionet HPV janë shumë të shpeshta tek femrat e reja dhe në shumicën e rasteve ato reagojnë spontanisht, rekomandohet testi për HPV nga moshë 30 vjeçare.

Dokumenti është hartuar nga një grup profesional i Njësisë Operative dhe Zyrës së Marrëdhënieve me Publikun.
Përditësimi i prillit 2023