


Papillomavirus

QU'EST-CE QUE C'EST ET COMMENT LE PRÉVENIR



L'infection par le papillomavirus est l'infection sexuellement transmissible la plus fréquente. Elle est plus diffusée dans la population féminine et peut provoquer le cancer du col de l'utérus.

L'atout dans la lutte contre l'infection par le papillomavirus est la prévention : la région de la Vénétie promeut un programme de dépistage qui propose des contrôles réguliers et gratuits.



LE PAPILOMAVIRUS (il papillomavirus)

QU'EST-CE QUE C'EST ? (Cos'è)

Il s'agit d'un virus dont il existe plus de 100 types : certains sont responsables de lésions bénignes, d'autres sont capables de produire des lésions pré-invasives (dysplasies) et invasives. Parmi ces dernières, la principale en termes de fréquence et d'impact sur la santé est le cancer du col de l'utérus, qui est causé dans la quasi-totalité des cas par une infection par le virus du papillome humain (VPH).

COMMENT SE TRANSMET-IL ? (Come si trasmette)

L'infection par le VPH est l'infection sexuellement transmissible la plus fréquente : l'absence de symptômes favorise sa diffusion, car la plupart des personnes touchées ne sont pas conscientes du processus d'infection en cours. L'infection par le VPH est plus fréquente dans la population féminine.

COMMENT EST-IL DIAGNOSTIQUÉ ? (Come si diagnostica)

Une lésion génitale « dangereuse » peut être identifiée à un stade précoce en effectuant régulièrement un test de Papanicolaou (frottis vaginal) ou un examen cytologique cervico-vaginale,

un prélèvement de cellules de la surface du col et du canal cervical de l'utérus, ou un test VPH, qui consiste en un prélèvement similaire à celui du frottis.

Le frottis et le test VPH sont des examens simples, rapides et indolores. Réalisés régulièrement, selon le calendrier prévu par les programmes de dépistage, ils permettent d'identifier les dysplasies, de les enlever et de prévenir le développement d'un cancer.

COMMENT LE PRÉVENIR ? (Come si previene)

La clé de la lutte contre les infections par le papillomavirus et les maladies associées, principalement le cancer du col de l'utérus, est la prévention.

Aujourd'hui on dispose de vaccins sûrs, bien tolérés et efficaces pour prévenir l'infection persistante par les souches de papillomavirus responsables de la majorité des cas de cancer du col de l'utérus.

Toutefois, il convient de souligner que le vaccin complète, mais ne remplace pas, le dépistage par le frottis et le test VPH.

En effet, comme le vaccin ne protège pas contre tous les types de VPH et que, dans tous les cas, aucun vaccin ne peut garantir une protection totale, il est conseillé à toutes les femmes d'adhérer au dépistage, même après la vaccination.

DÉPISTAGE DU CANCER DU COL DE L'UTÉRUS DANS LA RÉGION DE LA VÉNÉTIE (Lo screening della cervice uterina in Veneto)

QU'EST-CE QUE C'EST ? (Cos'è)

Il s'agit d'un programme de prévention visant à réduire la mortalité due au cancer du col de l'utérus, en permettant un diagnostic précoce et l'identification de lésions particulières qui ont une forte probabilité d'évoluer vers un cancer (lésions précancéreuses).

À QUI S'ADRESSE-T-IL ? (A chi si rivolge)

Il s'adresse à toutes les femmes résidant dans la région de la Vénétie à partir de 25 ou 30 ans, en fonction de leur état vaccinal pour la vaccination contre le papillomavirus, et jusqu'à 64 ans.

ULSS2 | PAPILOMAVIRUS

Les femmes vaccinées contre le VPH avant l'âge de 15 ans ont un risque très réduit de développer des tumeurs ou des lésions pré-tumorales, c'est pourquoi elles commencent le dépistage à l'âge de 30 ans. Les femmes non vaccinées contre le VPH avant l'âge de 15 ans, en revanche, commencent le dépistage à partir de 25 ans.

QUE PRÉVOIT-IL ? (Cosa prevede)

Le programme de dépistage du cancer du col de l'utérus propose, par lettre d'invitation :

- le frottis tous les trois ans aux femmes âgées de 25 à 29 ans qui n'ont pas été vaccinées contre le VPH ;
- le frottis tous les cinq ans à toutes les femmes âgées de 30 à 64 ans.

Le dépistage le plus approprié est proposé à chaque groupe d'âge, sur la base des caractéristiques du test et du risque pour la femme de développer un cancer ou des lésions pré-tumorales.

DIFFÉRENCES ENTRE LE TEST VPH ET LE FROTTIS (Differenze tra test HPV e Pap test)

Le test VPH est un examen introduit récemment qui recherche une infection par le VPH, tandis que les frottis recherchent les lésions causées par l'infection elle-même. Le test VPH est plus sensible que le frottis et, pour cette raison, il peut être effectué tous les cinq ans au lieu de trois. Toutefois, comme les infections par le VPH sont très fréquentes chez les jeunes femmes et que, dans la plupart des cas, elles régressent spontanément, le test VPH est recommandé à partir de l'âge de 30 ans.

