



Tabelle riassuntive
Sintesi dei risultati della sorveglianza
PASSI 2022 – 2024—Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana

Descrizione del campione

ULSS 2	
Numerosità	
	%
Uomini	50.4
Donne	49.6
Classi di età	
18-34	26.16
35-49	29.15
50-69	44.69
Titolo di studio	
Nessuno/elementare	1.49
Media Inferiore	25.38
Media superiore	50.94
Laurea	22.19
Livello di istruzione	
Basso*	26.87
Alto**	73.13
Stato civile	
Coniugati	54.83
Celibi/nubili	37.59
Vedovi/e	1.44
Separati/divorziati	6.14
Cittadinanza	
Italiana	90.83
Straniera	9.17
Situazione lavorativa***	
Occupato	70.35
Non Occupato	29.65
Difficoltà economiche	
Molte	5.74
Qualche	26.96
Nessuna	67.3

*licenza media inferiore o licenza elementare o nessun titolo

**licenza media superiore o laurea

***campione compreso tra 18 e 65 anni

	ULSS 2		
	%	IC 95%	
Salute percepita			
Molto bene/bene	71.00	67.80	74.01
discretamente	26.30	23.35	29.48
Male / molto male	2.70	1.84	3.95
Persone con una percezione della salute positiva (bene /molto bene)			
• genere			
Uomini	77.21	72.81	81.07
Donne	64.68	60.08	69.02
• classi di età			
18-34	85.14	79.35	89.53
35-49	76.65	71.1	81.42
50-69	58.99	53.71	64.08
• titolo di studio			
Nessuno/ elementare	47.1	28.65	66.38
Media Inferiore	58.85	51.58	65.75
Media superiore	73.67	69.24	77.67
Laurea	80.33	73.9	85.48
• difficoltà economiche			
Molte	45.35	32.58	58.76
Qualche	58.46	51.74	64.88
Nessuna	78.27	74.85	81.33
• cittadinanza			
Italiana	70.27	66.86	73.47
Straniera	76.54	64.46	85.45
• presenza di patologie			
Almeno una patologia cronica	51.07	43.77	58.33
Numero di giorni riferiti con limitazione di attività per motivi fisici e psicologici			
0 giorni	77.03	74.19	79.64
1-13 giorni	19.02	16.58	21.72
14+ giorni	3.96	2.84	5.49
Sintomi di depressione (%-IC 95%)			
Nelle ultime due settimane	8.39	6.66	10.52
Ha cercato aiuto da qualcuno	54.84	43.69	65.52
La richiesta di aiuto per sintomi di depressione			
Medico/op sanitario	21.93	13.76	33.1
Famiglia/amici	14.56	9.38	21.91
Entrambi	24.47	14.51	38.21
Nessuno	39.03	28.12	51.17

Attività fisica

ULSS 2			
	%	IC 95%	
Livello di attività fisica			
Attivo*	55.7	52.33	59.02
Parzialmente attivo**	30.12	27.1	33.32
Sedentario***	14.18	11.94	16.76
Sedentari per:			
• genere			
Uomini	10.85	8.36	13.96
Donne	17.57	14.03	21.79
• classi di età			
18-34	12.5	8.48	18.03
35-49	13.37	9.6	18.32
50-69	15.7	12.37	19.71
• titolo di studio			
Nessuno/elementare	37.14	20.46	57.57
Media Inferiore	16.72	12.01	22.8
Media superiore	14.49	11.4	18.25
Laurea	8.94	6.08	12.98
• difficoltà economiche			
Molte	27.53	16.34	42.5
Qualche	14.18	10.02	19.69
Nessuna	13.06	10.57	16.02
• cittadinanza			
Italiana	13.66	11.37	16.33
Straniera	20.87	12.56	32.62
• patologie			
Sintomi di depressione	18.18	10.03	30.69
Fumatore	12.59	8.17	18.92
Ipertensione	19.99	14.36	27.13
Sovrappeso	13.77	10.77	17.45
Comportamento del medico o dell'operatore sanitario****			
Ha consigliato di fare dell'attività fisica	34.05	30.54	37.73
Percezione del livello di attività fisica			
Sedentari che percepiscono sufficiente il proprio livello di attività fisica	16.92	10.99	25.16

*lavoro pesante oppure adesione alle linee guida (30 minuti di attività moderata per almeno 5 giorni alla settimana oppure attività intensa per più di 20 min per almeno 3 giorni)

**non fa lavoro pesante, ma fa qualche attività fisica nel tempo libero, senza raggiungere i livelli raccomandati

***non fa un lavoro pesante e non fa nessuna attività fisica nel tempo libero

****vengono escluse le persone che non sono state dal medico negli ultimi 12 mesi

Situazione nutrizionale e abitudini alimentari

ULSS 2			
	%	IC 95%	
Situazione ponderale			
Sottopeso/normopeso	59.83	56.52	63.05
Sovrappeso	27.34	24.46	30.42
Obeso	12.83	10.74	15.26
Eccesso ponderale (sovrappeso /obeso)	40.17	36.95	43.48
Almeno 5 porzioni di frutta e verdura al giorno	8.14	6.48	10.18

Persone in <u>eccesso ponderale</u> :	Sovrappeso			Obesi		
	%	IC 95%		%	IC 95%	
• genere						
Uomini	34.42	29.95	39.19	11.15	8.54	14.44
Donne	20.03	16.69	23.85	14.57	11.49	18.31
• classi di età						
18-34	11.76	8.62	15.84	5.02	3.06	8.14
35-49	27.75	22.49	33.7	12.82	9.28	17.45
50-69	36.17	31.47	41.14	17.4	13.78	21.73
• titolo di studio						
Nessuno/elementare	35.54	20.09	54.73	20.56	8.46	42.02
Media Inferiore	34.99	28.5	42.08	21.46	16.04	28.09
Media superiore	26.02	22.13	30.33	11.53	8.88	14.85
Laurea	21.02	16.02	27.07	5.39	3.49	8.24
• difficoltà economiche						
Molte	33.36	20.99	48.55	23.09	13.84	35.95
Qualche	30.46	24.66	36.94	15.03	10.62	20.83
Nessuna	25.45	22.18	29.03	11.06	8.73	13.92
• cittadinanza						
Italiana	26.96	24	30.12	12.28	10.13	14.82
Straniera	30.18	19.85	43.01	12.84	6.68	23.27
Consiglio perdita/controllo del peso	37.93	31.54	44.77	70.17	59.96	78.7

*vengono escluse le persone che non sono state dal medico negli ultimi 12 mesi

Consumo di alcol

ULSS 2			
	%	IC 95%	
Consumo di alcol			
Consumo di alcol almeno una unità di bevanda alcolica negli ultimi 30 giorni*	72.77	69.61	75.72
Fuori pasto (esclusivamente o prevalentemente)	18.89	16.33	21.74
Consumo binge **	17.54	14.99	20.42
Consumo abituale elevato***	2.65	1.72	4.07
Consumo a maggior rischio ****	31.01	27.89	34.32
Consumatori a maggior rischio per:			
• genere			
Uomini	39.67	34.8	44.76
Donne	22.21	18.64	26.24
• classi di età			
18-24	60.25	49.63	69.98
24-34	58.61	49.69	67.01
35-49	26.23	21.14	32.05
50-69	17.71	14.04	22.11
• titolo di studio			
Nessuno/elementare	16.45	5.42	40.35
Media Inferiore	19.98	14.69	26.58
Media superiore	34.59	30.13	39.35
Laurea	36.31	29.41	43.83
• difficoltà economiche			
Molte	23.11	13.04	37.59
Qualche	31.24	24.96	38.3
Nessuna	31.51	27.81	35.46
• cittadinanza			
Italiana	31.4	28.1	34.91
Straniera	27.61	17.09	41.37
Comportamento del medico o dell'operatore sanitario*****			
Consigliato ai bevitori a maggior rischio di ridurre il consumo	5.36	2.87	9.79

*una unità di bevanda alcolica (UA) equivale ad una lattina di birra o a un bicchiere di vino o ad un bicchiere di liquore

**5 o più UA (per gli uomini) o 4 o più UA (per le donne) in una singola occasione, almeno una volta negli ultimi 30 giorni (definizione adottata dal 2010)

***più di 2 UA medie giornaliere, ovvero più di 60 unità alcoliche negli ultimi 30 giorni, (per gli uomini); più di 1 UA media giornaliera, ovvero più di 30 unità alcoliche negli ultimi 30 giorni (per le donne)

****consumo fuori pasto e/o consumo binge (secondo la definizione valida dal 2010) e/o consumo abituale elevato

*****vengono incluse solo le persone che riferiscono di essere state dal medico negli ultimi 12 mesi

Abitudine al fumo

ULSS 2			
	%	IC 95%	
Abitudine al fumo			
Fumatori*	22.6	19.88	25.59
Ex-fumatori**	17.67	15.39	20.22
Non fumatori***	59.72	56.31	63.04
Fumatori per:			
• genere			
Uomini	27.08	22.97	31.63
Donne	18.05	14.73	21.92
• classi di età			
18-24	27.06	19.38	36.41
25-34	28.09	20.68	36.91
35-49	27.58	22.2	33.7
50-69	16.41	13.01	20.49
• titolo di studio			
Nessuno/elementare	6.42	2	18.77
Media Inferiore	26.16	20.22	33.12
Media superiore	23.2	19.58	27.27
Laurea	18.01	12.68	24.95
• difficoltà economiche			
Molte	30.35	18.84	44.98
Qualche	27.78	21.63	34.9
Nessuna	19.84	16.85	23.21
• cittadinanza			
Italiana	22.81	19.98	25.91
Straniera	20.02	11.82	31.85
Comportamento del medico o dell'operatore sanitario****			
Ha chiesto se fuma	47.83	44.13	51.55
Ha consigliato di smettere di fumare	41.5	33.24	50.26
Smettere di fumare			
Fumatori che hanno tentato di smettere nell'ultimo anno	43.97	36.64	51.57
Fumatori che hanno tentato di smettere senza ausilio	83.99	79.59	87.59
Il rispetto del divieto di fumare			
Nel luogo di lavoro (sempre/quasi sempre)	96.16	94.79	97.18
Nei luoghi pubblici (sempre/quasi sempre)			
Nella propria abitazione (sempre)	93.84	91.85	95.38

*più di 100 sigarette nella propria vita e attualmente fumano tutti i giorni o qualche giorno o hanno smesso da meno di sei mesi

**più di 100 sigarette nella propria vita e attualmente non fumano da almeno 6 mesi

***meno di 100 sigarette nella propria vita e attualmente non fumano o non hanno mai fumato

****vengono escluse le persone che non sono state dal medico negli ultimi 12 mesi

Iperensione

	ULSS 2		
	%	IC 95%	
Iperensione arteriosa			
Misurazione di P.A. negli ultimi 2 anni	94.39	93.3	95.31
Persone che riferiscono di essere ipertese**	19.58	17.02	22.42
Trattamento dell'iperensione			
Trattamento farmacologico	65.3	57.8	72.12
Ridurre consumo di sale	70.52	63.19	76.92
Perdita/controllo del peso	65.87	58.38	72.64
Attività fisica regolare	73.03	65.73	79.26

Ipercolesterolemia

	ULSS 2		
	%	IC 95%	
Ipercolesterolemia			
Misurazione del colesterolo almeno una volta negli ultimi 12 mesi	80.48	78.75	82.1
Persone che riferiscono di essere ipercolesterolemiche***	23.69	20.88	26.75
Trattamento dell'ipercolesterolemia			
Trattamento farmacologico	41.3	34.66	48.28
Più consumo di frutta/verdura	59.44	52.36	66.15
Meno consumo di carne/formaggi	82.68	77.39	86.94
Perdita/controllo del peso	59.25	51.88	66.23
Attività fisica regolare	72.65	65.45	78.83

*su tutte le persone >34 anni, senza patologie cardiovascolari

**Tra le persone a cui è stata misurata la pressione arteriosa

***Tra le persone a cui è stata misurata la colesterolemia

Diabete

	ULSS 2		
	%	IC 95%	
Diabete			
Prevalenza di diabetici	4.29	3.11	5.9

Diagnosi precoce delle neoplasie

	ULSS 2		
	%	IC 95%	
Collo dell'utero			
Effettuato un pap test preventivo negli ultimi 3 anni	80.71	76.16	84.56
Donne che hanno aderito allo screening organizzato	64.39	59.04	69.39
Donne che hanno effettuato il test spontaneamente	16.12	12.75	20.17
Mammella			
Effettuato una mammografia negli ultimi 2 anni	72.67	66.82	77.82
Donne che hanno aderito allo screening organizzato	48.64	42.77	54.55
Donne che hanno effettuato il test spontaneamente	24	19.45	29.22
Colon-retto			
Eseguito un test per la ricerca del sangue occulto a scopo preventivo negli ultimi 2 anni	75.75	71.16	79.82
Eseguita una colonscopia/rettosigmoidoscopia a scopo preventivo negli ultimi 5 anni	18.22	14.78	22.26

Vaccinazioni

	ULSS 2		
	%	IC 95% %	
Antinfluenzale*			
Vaccinati 18-64	7.7	4.36	13.24
Vaccinati 18-64 con almeno 1 patologia	33.5	6.91	77.37
Antirosolia			
Donne vaccinate 18-49 anni	63.64	62.81	64.45
Donne (18-49 anni) suscettibili**	28.78	28.03	29.54

*campagna 2016-2017

** non vaccinate e rubeotest negativo

Sicurezza

	ULSS 2		
	%	IC 95% %	
Sicurezza stradale			
Cintura anteriore sempre	97.27	96.07	98.11
Cintura posteriore sempre	56.74	53.12	60.3
Casco sempre	99.04	96.18	99.77
Guida sotto l'effetto dell'alcol*	6.55	4.82	8.85
Trasportato da un conducente sotto l'effetto dell'alcol	8.34	6.83	10.15
Sicurezza domestica			
Consapevolezza del rischio di infortunio domestico**	6.39	4.93	8.24
Infortunio per il quale c'è stato ricorso al medico di famiglia, al pronto soccorso o all'ospedale***	2.67	1.88	3.77

*percentuale di persone che dichiarano di aver guidato un'auto o una moto, negli ultimi 30 giorni, entro un'ora dall'aver bevuto 2 o più UA (su tutti quelli che, negli ultimi 30 giorni, hanno bevuto almeno un'unità alcolica e hanno guidato)

**Persone che dichiarano *alto o molto alto il rischio* di infortunio in ambiente domestico, per sé o i propri familiari

***Persone che dichiarano di aver avuto un infortunio domestico nei 12 mesi precedenti, per il quale è stato necessario il ricorso al medico di famiglia, al pronto soccorso o all'ospedale