

SCHEDA INFORMATIVA SU CPT-11 (IRINOTECAN CLORIDRATO)

Gent./Egr. Sig.ra /Sig.,

Lei è in trattamento con un farmaco che può dar luogo ad effetti collaterali.

- **Durante o immediatamente dopo l'infusione:**

si possono verificare nausea o vomito, crampi addominali, sudorazione, senso di malessere generale, diarrea, lacrimazione eccessiva, salivazione, disturbi della vista.

Questi sintomi si risolvono in fretta, sia spontaneamente che mediante la somministrazione di farmaci specifici. Durante i cicli successivi potranno essere prevenuti adottando una medicazione profilattica.

- **Dopo il primo giorno:**

si può verificare diarrea. Questa diarrea può essere grave se non trattata prontamente con appropriata terapia antidiarroica.

Dal momento in cui riceve la prima infusione di CPT-11, per tutta la durata del trattamento e fino a due settimane dopo l'ultima infusione deve interrompere l'uso di lassativi ed evitare i cibi o le bevande che accelerano il transito intestinale (succhi di frutta, latticini, frutta fresca e vegetali, cereali).

Al manifestarsi della diarrea, intraprenda immediatamente le seguenti misure:

1. prenda subito il farmaco antidiarroico che è stato prescritto alla dimissione, alle dosi e per la durata raccomandata. Non diminuisca la dose o la durata del trattamento di propria iniziativa. Le verrà fornito il farmaco antidiarroico al primo accesso;
2. beva grosse quantità di acqua e di liquidi contenenti sali (acqua minerale gassata, acqua di soda), con l'esclusione di succhi di frutta e latticini per tutta la durata della diarrea;
3. se persiste la diarrea informi il Medico che ha prescritto il CPT-11.

Trattamento antidiarroico

Assuma 2 capsule di Loperamide subito dopo la prima scarica liquida.
In seguito assumi 1 capsula dopo ciascuna evacuazione di feci liquide.
Dose massima 8 capsule al giorno.

Se la diarrea non si risolve, informi immediatamente il Suo Medico perché la durata del trattamento con Loperamide non può superare le 8 capsule; il Suo Medico deciderà come trattare la diarrea persistente.

Se non è in grado di bere o di ingerire il farmaco Loperamide per nausea o vomito, informi subito il Suo Medico.

Se la diarrea dura per più di 24 ore nonostante il trattamento con Loperamide raccomandato, deve informare subito il Suo Medico.

Non prenda i farmaci antidiarroici per prevenire la diarrea, ma solo in caso di feci liquide.

Si può verificare febbre: informi immediatamente il Suo Medico.