




Papillomavirus

CHE COS'È E COME SI PREVIENE



L'infezione da Papillomavirus è la più frequente infezione sessualmente trasmessa. È più diffusa nella popolazione femminile e può causare il tumore della cervice uterina.

La carta vincente per la battaglia contro l'infezione da papillomavirus è la prevenzione: la Regione Veneto promuove un programma di screening che prevede test regolari e gratuiti.



IL PAPILOMAVIRUS

Cos'è

È un virus di cui esistono oltre 100 tipi: alcuni sono responsabili di lesioni benigne, altri sono in grado di produrre lesioni pre-invasive (displasie) ed invasive. Tra queste, la principale in termini di frequenza e impatto sanitario è il tumore della cervice uterina, che è causato nella quasi totalità dei casi dall'infezione da HPV (*Human Papilloma Virus*).

COME SI TRASMETTE

L'infezione da HPV è in assoluto la più frequente infezione sessualmente trasmessa: l'assenza di sintomi ne favorisce la diffusione poiché la maggior parte degli individui affetti non è a conoscenza del processo infettivo in corso. L'infezione da HPV è più frequente nella popolazione femminile.

COME SI DIAGNOSTICA

È possibile identificare precocemente una lesione genitale "pericolosa" sottoponendosi regolarmente ad un Pap-test o esame citologico cervi-

co-vaginale, un prelievo di cellule dalla superficie del collo e dal canale cervicale dell'utero, o all'HPV-test, che prevede un prelievo simile a quello del Pap-test.

Il Pap-test e l'HPV-test sono esami semplici, rapidi e indolori. Eseguiti con regolarità, secondo le tempistiche previste nei programmi di screening, consentono di identificare le displasie, rimuoverle e impedire lo sviluppo del tumore.

COME SI PREVIENE

La carta vincente per la battaglia contro l'infezione da papillomavirus e le malattie ad essa associate, in primis il cancro della cervice uterina, è la prevenzione.

Oggi abbiamo a disposizione dei vaccini sicuri, ben tollerati ed efficaci nel prevenire l'insorgenza di un'infezione persistente da parte dei ceppi di virus HPV responsabili della gran parte dei casi di tumore della cervice uterina.

Tuttavia, è bene sottolineare che l'utilizzo del vaccino affianca, ma non sostituisce, lo screening con il Pap-test e l'HPV-test.

Infatti, dal momento che il vaccino non fornisce protezione nei confronti di tutti i tipi di HPV e che, in ogni caso, nessun vaccino può garantire una protezione pari al 100%, è opportuno che tutte le donne aderiscano agli screening, anche dopo la vaccinazione.

LO SCREENING DELLA CERVICE UTERINA IN VENETO

Cos'è

È un programma di prevenzione che ha l'obiettivo di ridurre la mortalità per tumore della cervice uterina, permettendo la diagnosi precoce e l'identificazione di particolari lesioni che hanno elevata probabilità di evolvere in tumore (lesioni precancerose).

A CHI SI RIVOLGE

È rivolto a tutte le donne che hanno residenza in Veneto a partire dai 25 o 30 anni di età, a seconda dello stato vaccinale per la vaccinazione contro il Papillomavirus (HPV), e fino ai 64 anni.

Le donne vaccinate contro HPV entro i 15 anni hanno



un rischio molto ridotto di sviluppare tumori o lesioni pretumorali, per cui iniziano lo screening a 30 anni. Le donne non vaccinate contro HPV entro i 15 anni, invece, iniziano lo screening a 25 anni.

COSA PREVEDE

Il Programma di Screening della cervice uterina propone, tramite lettera d'invito:

- il Pap test ogni tre anni alle donne dai 25 ai 29 anni non vaccinate contro HPV
- il test HPV ogni 5 anni a tutte le donne dai 30 ai 64 anni.

Viene offerto il test di screening più appropriato ad ogni fascia d'età, sulla

base delle caratteristiche del test e sul rischio della donna di sviluppare tumore o lesioni pretumorali.

DIFFERENZE TRA TEST HPV E PAP TEST

Il test HPV è un esame di recente introduzione che ricerca l'infezione da HPV, mentre il Pap test ricerca le lesioni causate dall'infezione stessa. Il test HPV è più sensibile rispetto al Pap test e, per tale ragione, può essere eseguito ogni 5 anni anziché 3. Tuttavia, poiché nelle donne più giovani le infezioni da HPV sono molto frequenti e nella gran parte dei casi regrediscono spontaneamente, il test HPV è raccomandato a partire dai 30 anni.



Il documento è stato elaborato da un gruppo multiprofessionale dell'Unità Operativa e dall'Ufficio Relazioni con il Pubblico

Aggiornamento aprile 2023