



DOSAGGI PARACETAMOLO

Peso (kg)	Dose singola Gocce	Dose giornaliera
3.2	8 gocce	Fino a 4 volte (ogni 6 ore)
4.3	10 gocce	Fino a 4 volte (ogni 6 ore)
5.3	13 gocce	Fino a 4 volte (ogni 6 ore)
6.1	22 gocce	Fino a 4 volte (ogni 6 ore)
6.7	25 gocce	Fino a 4 volte (ogni 6 ore)
	Sciroppo	
7.2	4.5 ml	Fino a 4 volte (ogni 6 ore)
8	5 ml	Fino a 4 volte (ogni 6 ore)
9	5.5 ml	Fino a 4 volte (ogni 6 ore)
10	6 ml	Fino a 4 volte (ogni 6 ore)
11	6.5 ml	Fino a 4 volte (ogni 6 ore)
12	7.5 ml	Fino a 4 volte (ogni 6 ore)
14	8.5 ml	Fino a 4 volte (ogni 6 ore)
16	10 ml	Fino a 4 volte (ogni 6 ore)
18	11 ml	Fino a 4 volte (ogni 6 ore)
20	12.5 ml	Fino a 4 volte (ogni 6 ore)
	Supposte 62.5 mg	
3.2-5	1	Fino a 4 volte (ogni 6 ore)
	Supposte 125 mg	
6-7	1	Fino a 4 volte (ogni 6 ore)
7-10	1	Fino a 5 volte (ogni 4-6 ore)
11-12	1	Fino a 6 volte (ogni 4 ore)
	Supposte 250 mg	
11-12	1	Fino a 3 volte (ogni 8 ore)
13-20	1	Fino a 4 volte (ogni 6 ore)

DISTRETTO TREVISO

PUNTO UNICO VACCINAZIONI

Telefono: 0422 323866

orario 8.30-14 dal lunedì al venerdì

Mail: puntounicovaccinazioni@aulss2.veneto.it

Indicare sempre un numero di cellulare a cui essere ricontattati

DISTRETTO PIEVE DI SOLIGO

PUNTO UNICO VACCINAZIONI

Telefono: 0438 663928

orario 9-13 dal lunedì al venerdì

Mail: vaccinazioni.pieve@aulss2.veneto.it

Indicare sempre un numero di cellulare a cui essere ricontattati

DISTRETTO ASOLO

PUNTO UNICO VACCINAZIONI

Telefono: 0423-611611

orario 9-13 dal lunedì al venerdì

Mail: sisp.asolo@aulss2.veneto.it

Indicare sempre un numero di cellulare a cui essere ricontattati

Dipartimento di Prevenzione
Servizio di Igiene e Sanità Pubblica



I consigli dopo
la vaccinazione

PENSO CHE IL BAMBINO ABBI LA FEBBRE

Cosa posso fare?



Prima di tutto verificate se il bambino ha la febbre e **misurate la temperatura**.

Se il bambino ha la febbre:

- **dategli da bere in abbondanza**
- **vestitelo in modo leggero** senza coprirlo eccessivamente
- **se la febbre supera i 38.5°C potete somministrare paracetamolo** secondo il peso del bambino, ai dosaggi indicati nella tabella sul retro
- **NON dare aspirina** ai bambini

Se il bambino, nonostante la somministrazione del paracetamolo, continua ad avere la febbre per oltre 24 ore, o se presenta sintomi insoliti, consultate il pediatra oppure, in caso non sia reperibile, il pronto soccorso.

LA SEDE DOVE È STATA FATTA L'INIEZIONE È CALDA, GONFIA E ARROSSATA

Cosa posso fare?

Applicare un panno pulito e fresco sulla zona dolorosa ed infiammata.

Se ritenete che il bambino abbia molto dolore poiché reagisce alla minima pressione, **potete somministrare paracetamolo**, ai dosaggi indicati secondo il peso del bambino.



IL MIO BAMBINO È IRREQUIETO

Cosa posso fare?

Dopo la vaccinazione i bambini possono essere particolarmente irrequieti o piangere poiché possono sentire dolore nella sede dell'iniezione o avere la febbre.

Si può somministrare un farmaco, il **paracetamolo** che aiuta a ridurre il dolore e la febbre.

INDICAZIONI PER LA VACCINAZIONE ANTI-ROTAVIRUS

Dopo il cambio del pannolino lavarsi accuratamente le mani fino 7 giorni dopo la somministrazione del vaccino.

Se il bambino dovesse presentare sintomi quali: dolori addominali, vomito, presenza di sangue nelle feci, gonfiore addominale e/o febbre elevata, è necessario rivolgersi al proprio pediatra o alla guardia medica.

