

PREPARAZIONE PAZIENTI IN TERAPIA ANTICOAGULATE CON INDICAZIONE ALL'ESAME AGOASPIRATO ECOGUIDATO

Gentile paziente, per una corretta esecuzione dell'esame, Le chiediamo di leggere attentamente le informazioni riportate in questa scheda.

- Se si assume terapia anticoagulante tipo Acenocumarolo (Sintrom), Wafarin (Coumadin), rivolgersi al centro TAO di riferimento o allo Specialista Cardiologo per la sostituzione del farmaco con eparina a basso peso molecolare.

- Se si assumono anticoagulanti di nuova generazione tipo Dabigant (Pradaxa), Rivoxaban (Xarelto), Apixaban (Eliquis), non vi sono motivi fondamentali per sospendere la terapia.

- Se si eseguono iniezioni di Clexane, sospendere la terapia 2 giorni prima dell'esame.

- Se si è in trattamento con farmaci anti-aggreganti tipo Acidoacetilssilico (Cardioaspirin), Ibuprofene (Ibustrin);, Ticlopidina (Tiklid), Clopidogrel (Plavix), sospendere almeno 3 giorni prima dell'esame e fino a 3 giorni dopo.

- Altri farmaci che mettono il paziente a rischio di emorragia:
 - Prasugrel (Efient), sospendere 7 giorni prima.
 - Ticagrelor (Brilique), sospendere almeno 3 giorni prima dell'esame.

La terapia potrà essere ripristinata dopo 1-4 giorni dall'esame, sentito il Medico curante.

Il giorno dell'esame non è necessario essere a digiuno.

È indispensabile portare con sé tutta la documentazione sanitaria in possesso per l'agoaspirato (precedenti ecografie, altre indagini strumentali, visite specialistiche, analisi del sangue).